

# Verderón Común (*Carduelis chloris*)

Texto Antonio Mochón



## Características del macho

**Pico:** Grueso y cónico; de color carne teñido de bruno.

**Ojos:** Castaños oscuro.

**Cabeza:** Gruesa, ancha, aplanada con el cuello bien relleno; de color verde; frente bien marcada; bigotes y mejillas gris-ceniciento.

**Espalda:** Verde-oliva con reflejos brunaceos.

**Hombros:** Verde-amarillento luminoso.

**Pecho:** Verde-oliva luminoso.

**Garganta:** Verde-amarillo luminoso.

**Flancos:** Verde-oliva.

**Vientre:** Gris-blanquecino.

**Alas:** Grandes remiges negro-brunaceo con la orilla externa amarillo vivo formando un reflejo sobre las 2/3 partes superiores; remiges secundarias gris negruzcas con un ribete gris mas claro en la extremidad; el ala esta bordeada de amarillo del hombro en la extremidad de las remiges bastardas, a continuación del espejo o lunar.

**Cola:** Amarillo vivo en la base y negro-brunaceo en la extremidad con un ribete gris a lo largo de toda la orilla externa; las dos rectrices medianas son de un color negro-brunaceo en toda la longitud; la cola es corta con la extremidad ahorquillada.

**Patas y dedos:** De color carne.

**Uñas:** Color carne oscura.



### El autor...

Antonio Mochón Sánchez es Juez OMJ-COM de Color. Juez Nacional de Fauna Europea e Híbridos

### Observaciones

Hay que tener en cuenta que existen pájaros nevados e intensos, esta diferencia está bien marcada en los verderones; los jóvenes machos pueden presentar un reflejo bruno.

### Características de la hembra

Tiene las mismas características que el macho pero el color es bruno-grisáceo. El ribete amarillo de las remiges y de las rectrices es menos ancho y más atenuado. La orla amarilla del hombro no existe. Ciertas hembras pueden presentar una tonalidad mas bruna pero mas estriada sobre la espalda, o una tonalidad mas verde con menos estrías.





**Defectos clásicos en el Verderón Común en los machos y en las hembras**

- Cabeza demasiado plana y demasiado pequeña.
- Giba en la nuca.
- Dibujos de las mejillas no visibles.
- Cuerpo no bastante rechoncho.
- Ribete amarillo no visible en los machos.
- Espalda hundida.
- Mancha amarilla sobre la frente.

**IMPORTANTE:** El cuerpo de los verderones debe de ser rechoncho y de una buena talla. Este pájaro debe de ser elegante en su presentación, no debe de estar acostado sobre el palo sino todo lo contrario, debe de levantar el cuerpo y presentar cierto porte y gallardía. Un buen ejemplar de exposición debe de tener el cuello bien repleto y una cabeza bastante fuerte. Esto es igualmente valido para todas las mutaciones.

**Diámetro máximo de la anilla:  
3 mm**



**COLEGIO DE JUECES DE ANDALUCIA**  
FEDERACION ORNITOLÓGICA ANDALUZA  
**PLANILLA DE ENJUICIAMIENTO DE FAUNA EUROPEA E HÍBRIDOS**

Nombre del criador: .....  
 Concurso de: CLUB DE LAS PALMAS TÁRROFA  
 Denominación: VERDERÓN COMÚN  
 Mutación: ORNITÓFILA  
 Grupo: 4 Jaula nº: 325 Nº de anilla: .....

		A	B	C	D
Diseño	30	27			
Color	30	26			
Talla y Forma	30	16			
Plumaje	10	8			
Posición, Condición e Impresión	10	8			
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>85</b>			
SUMA EQUIPO					
ARMONIA					
TOTAL EQUIPO					



Fecha: 23-11-2009

os jueces

Palmarés:

A. MOCIÓN  
Juez omj-color-fauna e híbridos

Observaciones: DEBE DE MEJORAR LOS CONCEPTOS DE TALLA, FORMA Y POSICIÓN