

# Reyezuelo sencillo (*Regulus regulus*)

..pepegarcia.rizoso..

Texto de Julio Hernando  
Fotos de Pablo Barrena



Reyezuelo juvenil.

**E**n España habitan dos especies de Reyezuelos el Reyezuelo Sencillo (*Regulus regulus*) y el Reyezuelo Listado (*Regulus ignicapillus*).

Estos dos reyezuelos tienen en común dos franjas blancas en las alas que les cruza de forma transversal, tienen el pico fino y puntiagudo y su dieta es insectívora, habitan en bosques de cualquier tipo.

Las poblaciones de sencillo y listado a veces se solapan, cuando esto ocurre el listado se sitúa en la parte baja de los árboles y el sencillo en la parte alta.

El reyezuelo sencillo es el pájaro más pequeño que habita en Europa mide 9 cm. de longitud y 14 cm. de envergadura, pesando entre 5 y 6 g.

Están constantemente comiendo ya que un cuerpo tan pequeño no acumula ningún tipo de reserva.

Estos pájaros presentan dimorfismo sexual.

El **macho** tiene las plumas del píleo naranja con amarillo en los bordes.



El autor...

Julio Hernando Luengo, es  
Secretario de la F.O.N.  
CN 1N13  
Presidente de ACRIAPA  
juliohernandoluengo@gmail.com

La **hembra** tiene el pìleo amarillo, a veces con algo de naranja.



Los **juveniles** no presentan las manchas de la cabeza.



Vuela rápido pero con trechos muy cortos si el vuelo es mas largo su vuelo es ondulado

En otoño e invierno habita en pinares abetos sabinas siempre en árboles de hoja perenne.

Es un pájaro muy confiado con el hombre no son tan acrobáticos como el herrerillo (*Parus caeruleus*) y agitan las alas como los mosquiteros.

A partir de setiembre forman grupos y en febrero se forman las parejas

Cuando el macho esta en celo levanta el penacho naranja de la cabeza para atraer a la hembra.

Su nido, en forma de taza pequeña, es de musgo y líquenes y lo suelen construir debajo de una rama gruesa, tienen un periodo muy largo de incubación pues están incubando de 14 a 17 días y los pollos permanecen en el nido 19 días las puestas oscilan entre 7 y 11 huevos.

El reyezuelo efectúa dos puestas anuales. La primera la suele efectuar a principios de mayo y en los meses de junio y julio se produce la segunda puesta. En primavera el macho tiene mas acentuado el color naranja de la cabeza mientras que la hembra lo tiene mas apagado.

En España en principio parece ser que es un ave sedentaria, aunque durante los meses invernales se deben producir movimientos nomadicos e incluso llegan aves foráneas. Es una especie bastante abundante en todos los pinares y bosques maduros de la mitad norte española.

