

Rosellas

BASES GENERALES DE ENJUICIAMIENTO

Las bases de enjuiciamientos de las cotorras, es la pureza de la raza, el estado de salud y la condición. Veremos la explicación de los criterios de enjuiciamiento.

TALLA, POSTURA Y CONDICION

La talla del ejemplar a enjuiciar tiene que ser la talla mencionada en el estándar, esto es igualmente valorable para las mutaciones.

La postura.- En estado natural las cotorras mantienen en el posadero un ángulo de 50 a 60°. Alas cruzadas y cola en abanico tiene que ser juzgada en esta posición.

La condición.- Comprende la constitución y el estado de salud actual del pájaro, tiene que ser en los grande periquitos, de carácter vivo, despierto y no tímido, el pájaro no debe de estar malo ni sucio.

COLOR

El color debe de corresponder a la especie descrita, en el estado salvaje o a la mutación, estos tienen que ser luminosos, la distribución de los colores (dibujo) no se enjuicia en este apartado, por el contrario si se enjuicia la intensidad del color

DIBUJO

El dibujo se compone por la distribución de los colores, se tendrá en cuenta la extensión y la delimitación de estos.

PLUMAJE


En esta posición se enjuiciara la calidad del plumaje, que debe de ser completo y peinado.

ALAS Y COLA

Se juzgaran las plumas alares caudales que deben de ser completas. Alas cruzadas lo mismo que cola en abanico serán penalizadas.

PICO, PIERNAS, PIES Y UÑAS

El pico no debe de ser prominente, tiene que ser liso, sin heridas ni rasguños, las uñas serán completas, no demasiado largas, los pies serán del color de la especie.



TERMINOS USUALES PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS COTORRAS
 PLATYCERCUS

Platycercus adelaidae

Taille 26 cm



Cotorra de Adelaida

Talla, posición y condición

Talla: 35 cm, estatura poderosa (vigorosa)

Postura: Arededor de los 55-60°, elegante derecho y fiero. Las alas plegadas cubriendo las plumas del obispillo.

Condición: El pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.

Color y dibujo

Zonas del plumaje. Color

Parte superior de la cabeza, pecho: Rojo naranja

Lados de la cabeza y nuca: Amarillento.

Mancha sobre la mejilla: Azul.

Dorso y coberteras de las alas: negro, con largos bordes amarillo-oliva a naranja palido.

Mancha sobre la espalda: negra.

Cobertera del ala, remiges secundarias y bordes exteriores de las remiges primarias: azules.

Plumas caudales centrales: verde delavado.

Plumas caudales laterales: azules con puntos blancos.

Pico: Gris plata.

Ojos: Bruno fuerte.

Patas: Grises.

Uñas: Bruno oscuro.

Hembra (Diferencia con respecto al macho).

En general un poco mas pequeña, parte superior del pico más fino.

Observaciones

La coloración varia fuertemente de un sujeto a otro. Una colección tendria que ser equilibrada en su reseña.

Platycercus venustus

Taille 28 cm



Cotorra de Browns

Talla, postura, condición

Talla: 28 cm., estructura fina, elegante y derecha

Postura: alrededor de 60°, todo el cuerpo está bien proporcionado y armonioso. La cabeza presenta una curvatura ligera que forma una línea extendiéndose desde el dorso a la cola. Las alas encima de la cola sin cruzarse.

Condición: el pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes

COLOR Y DIBUJO:

Macho

Zona de plumaje, color

Frente, arriba de la cabeza y parte superior de alrededor de la cabeza: negro.

Mancha sobre la espalda, coberteras interiores de las alas: negra

Nuca: negra bordeada de amarillo pálido.

Dorso: negro con largos bordes amarillo pálido

Bajo del dorso y garganta: amarillo pálido bordeado de negro

Obispillo: amarillo pálido con bordes oscuros

Encima de la cola: azul-verde oscuro, pasando al azul

Cobertera del ala: azul violeta.

Mancha sobre la mejilla: blanca.

Bajo de la mejilla: violeta-azul bordeado

Pecho y vientre: amarillo pálido con finos bordes negros.

Bajo del vientre: amarillo pálido con ligeros bordes oscuros.

Coberteras de la base de la cola: rojas

Debajo, de la base de la cola: azul pálido aclarándose

Coberteras interiores de las alas: remiges primarias negras

Coberteras exteriores de las alas: violeta-azul

Reminges secundarias: negras, violeta azul

Bordes de las reminges: primarias azul-negras

Pico: color cuerno, gris

Patas: grises

Uñas: color antracita.

Ojos: bruno oscuro

Cerco ocular: gris

Hembra (diferencia con respecto al macho)

Cabeza más redondeada y más pequeña, encima del pico más fino.

Observaciones:

Si apareciese rojo en el plumaje de la cabeza será penalizado.

Sujeto Browns con un ligero toque de azul en el plumaje del pecho no será penalizado. Ellos tienen una coloración más intensa, sujeto con y de otro sin mancha azul no forma una misma especie.

Platycercus caledonicus

Taille 37 cm



Cotorra de vientre amarillo

Talla, postura, condición

Talla: 37 cm. estructura grande y vigorosa

Postura: Alrededor de 55-60°, elegante y derecha. La cabeza del macho presenta una curvatura aplanada que se prolonga justo a una línea derecha del dorso y la cola. La cabeza de la hembra es más pequeña y más redondeada, arriba del pico más estrecho.

Condición: el pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.

Color y dibujo:

Macho

Zona de plumaje, Color

Banda frontal: roja, estirándose justo a los ojos

Arriba de la cabeza, garganta: amarillo

Alrededor de la cabeza: amarillo con bordes oscuros.

Nuca: amarillo con bordes negro-oliva

Dorso: negro con bordes verde oscuro

Bajo del dorso: negro bordeado de negro oliva

Obispillo: verde oscuro, bordeado de verde oliva

Arriba de la cola: verde oliva pasando al azul

Caudales laterales: azules

Coberteras del bajo de la cola: amarillas

Mancha sobre la mejilla: azul oscuro

Debajo de la cola: azul cielo bordeado de blanco

Pecho, vientre y bajo del vientre: amarillo con un fino borde oscuro

Mancha sobre la espalda: negra

Cobertera de las alas, remiges secundarias: azul cobalto

Coberteras interiores de las alas: negro verdoso

Coberteras exteriores de las alas: azul cielo

Reminges primarias: negras

Bordes exteriores de las reminges primarias: negro-grisáceo volviéndose más clara

Pico: gris claro

Patas: gris

Uñas: negras

Ojos: bruno oscuro

Cerco ocular: gris

Hembra (diferencia con respecto al macho)

De apariencia general mas frágil, cabeza mas pequeña pero mas redonda.

Parte superior del pico mas fino

Observación:

Si apareciese rojo en le dibujo del pecho y el vientre, será penalizado

Platycercus elegans

Taille 37 cm



Cotorra De Pecho y vientre rojo (Rosella)

Talla, postura, condición

Talla: 36 cm. estructura potente (robusta)

Postura: alrededor de 55-60°, elegante, derecho y fiero. Las alas cubren las plumas del obispillo. Cabeza del macho aplanada, de la hembra más redondeada. Pico del macho más robusto.

Condición: el pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.

Color y dibujo:

Macho

Zona de plumaje, color

Cabeza, nuca y toda la parte inferior: rojo fuerte

Mancha sobre la mejilla: azul fuerte

Espalda: negra

Dorso: negro bordeado de rojo

Borde exterior de las remiges primarias, grandes coberteras del ala: azul cielo

Remiges primarias: negras bordeadas de azul

Caudales centrales: azul fuerte con puntos blancos

Caudales laterales: azul cielo con puntos blancos

Pico: gris plata con la punta oscura

Ojos: bruno oscuro

Patas: grises

Uñas: bruno oscuro

Hembra (diferencia con respecto al macho)

En general un poco más pequeña. Color y dibujo parecido al macho

OBSERVACIONES:

Existen 2 razas geográficas: el penan verde y el penan rojo. Suele el joven pájaro presentar un plumaje juvenil a dominancia verde o a dominancia roja.

Platycercus eximius

Taille 32 cm



Cotorra multicolor o cotorra de manto amarillo

Talla, postura, condición

Talla: 36 cm, estructura, pequeña y vigorosa.

Postura: En torno a los 55-60°, las alas plegadas, no se deben de cruzar. Cabeza aplanada que se prolonga justo a la línea del dorso, sin formar rotura un jiba, la cabeza de la hembra y mas pequeña y mas redonda.

Condición: el pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.

Color y dibujo

Macho

Zona del plumaje . Color

Frente, debajo de la cabeza, parte superior, arriba de la cabeza, garganta, pecho y coberteras caudales inferiores:

Rojo

Dorso: Negro bordeado de amarillo.

Bajo del dorso: verde bordeado de azul.

Obispillo: Verdes con bordes mas finos en verde.

Coberteras caudales: oliva, bordeado de azul oscuro.

Mancha sobre la mejilla: blanca.

Vientre: amarillo con un borde fino oscuro.

Bajo del vientre: amarillo verdoso.

Debajo de la cola: azul cielo pasando al blanco.

Coberteras del ala, coberteras exteriores de las alas, remiges secundarias: azules.

Remiges primarias: negro gris.

Bordes exteriores de las remiges primarias: azul fuerte.

Pico: color corneo, gris.

Patas: grises.

Uñas: color antracita.

Ojos: Bruno oscuro.

Hembra (diferencia con respecto al macho):

Mancha sobre las mejillas más pequeñas. Ligeramente velado de gris-bruno. Parte superior alrededor de la cabeza salpicado de verde-amarillo.

Todos los otros colores un poco mas mate.

Observaciones.

La rosella tiene el dibujo dorsal, negro bordeado de verde, no será nunca penalizado (raza geográfica), pájaros con bordes amarillos o verdes no pueden formar equipos.

Platycercus eximius (Mutation)

Taille 32 cm



Cotorra de manto rojo

Talla postura y condicion

Talla: 32 cm., estructura pequeña y vigorosa.

Postura: rodeando el 50-60°. Las alas pegadas no se cruzan nunca. La cabeza con curvatura aplanada que se prolonga justo a la línea del dorso sin formar quebraduras ni gibas.

Condicion: el pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.

Color y dibujo

Macho

ZONA DE PLUMAJE, COLOR

Frente, arriba de la cabeza, parte superior alrededor de la misma, garganta, pecho, vientre, bajo del vientre y obispillo: rojo vivo

Dorso: negro bordeado de rojo.

Mancha sobre la mejilla: blanca

Mancha sobre la espalda y la cobertera interiores de las alas: negras

Coberteras del ala, coberteras exteriores de las alas, remiges secundarias: azules

Remiges primarias: negras, ligeramente bordeada de azul.

Borde exteriores de las remiges primarias: azul fuerte

Pico: color corneo

Patas: grises

Uñas: color antracita

Ojos: bruno oscuro

HEMBRA (DIFERENCIA RESPECTO AL MACHO)

Mancha sobre la mejilla más pequeña, arriba del pico más pequeño, plumas caudales azules con rojo-canela.

OBSERVACIONES:

Una coloración amarilla sobre el dibujo de las coberteras del ala será penalizada. La rosella roja posee un sub.-plumaje blanco. Por lo que cada pluma rota en el pecho, vientre y dorso se vera una mancha blanca.

Platycercus eximius (Mutation lutino)

Taille 32 cm



Rosella lutino

Talla, postura, condicion

Talla: 32 cm., estructura pequeña y vigorosa.

Postura: rodeando el 50-60°. Las alas pegadas no se cruzan nunca. La cabeza con curvatura aplanada que se prolonga justo a la línea del dorso sin formar quebraduras ni gibas.

Condicion: el pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.

COLOR Y DIBUJO:

Macho

Zona de plumaje, color

Frente, arriba, alrededor de la parte superior de la cabeza y garganta: rojo

Pecho, coberteras caudales: rojas

Pico: color carne

Mancha sobre la mejilla: blanca

Remiges primarias: blancas

Mancha sobre la espalda: blanca con un ligero tinte azulado

Ventre, debajo del vientre, dorso: amarillo vivo

Caudales superiores: amarillo pálido

Caudales inferiores: blancas

Patas: color carne

Uñas: color carne

Ojos: rojo vivo

HEMBRA (DIFERENCIA RESPECTO AL MACHO)

Manca sobre las mejillas más pequeñas, colores mas mate.

Platycercus adscitus palliceps

Taille 32 cm



Cotorra de cabeza palida

Talla, postura, condición

Talla: 32 cm. estructura pequeña y vigorosa.

Postura: de 50-60 °, formando una línea derecha de la cabeza a la cola. Pico bien plaque.

Condición: el pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.

Color y dibujo: **Macho**

Zona de plumaje, color

Frente, arriba de la cabeza y parte superior alrededor de la cabeza: amarillo

Nuca: amarillo vivo

Dorso: negro bordeado de amarillo vivo

Bajo del dorso y obispillo: azul pálido

Coberteras caudales: verde oscuro con una mancha de azul verdoso

Mancha sobre la espalda, reminges primarias: negras

Garganta: azul con un fino borde

Mancha sobre la mejilla: blanca

Pecho, vientre y bajo del vientre: azul con un fino borde

Coberteras caudales inferiores: rojas

Caudales inferiores: azul pálido convirtiéndose mas claro

Coberteras del ala: azul cobalto

Coberteras interiores de las alas: azul a azul cobalto

Coberteras exteriores de las alas: azul, aclarándose sobre la punta

Reminges secundarias: azules con bordes negras azulados

Bordes exteriores de las reminges primarias: azul fuerte

Pico: color corneo a gris

Patas y círculo ocular: gris

Uñas: color antracita

Ojos: bruno fuerte

Hembra (diferencia respecto al macho)

Cabeza más pequeña pero más redondeada y parte superior del pico más fino

Observaciones.

Una coloración roja sobre el dibujo del plumaje de la cabeza será penalizada. Sujeto que presenta un dibujo dorsal negro con bordes amarillo-verdoso, están mezclados con una rosella de mejillas azules. Presentes sujetos con pecho azul intenso.

Platycercus adscitus adscitus

Taille 31 cm



Cotorra de mejillas azules

Talla, postura y condición

Talla: 31 cm, estructura pequeña y vigorosa.

Postura: 55-60°, formando una línea derecha de la cabeza a la nuca, alas plegadas.

Condición: el pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.

Color y dibujo: Macho

Zona de plumaje, color

Frente y debajo de la cabeza: amarillo pálido.

Parte superior y arriba de la cabeza: amarillo justo a la nuca, volviéndose estrecho.

Nuca: negro con bordes azul verde.

Bajo del dorso: amarillo verde con bordes azules.

Obispillo: amarillo verde, velado de azul.

Coberteras caudales superiores: verde fuerte pasando al azul fuerte.

Mancha en la espalda: negra.

Garganta: Azul fuerte con orde fino.

Mancha sobre la mejilla: blanca, mancha inferior azul cobalto.

Pecho, vientre y bajo del vientre: azul fuerte con fino bordeado.

Cobertera caudal inferior: azul cielo pasando al blanco.

Cobertera de las alas, remiges secundarias: azul cobalto.

Cobertera de las alas: negro bordeadas de azul cobalto.

Remiges primarias: negras.

Bordes exteriores de las remiges primarias: azul fuerte.

Pico: color corneo a gris.

Patas: grises.

Uñas: color antracita

Ojos: bruno oscuro.

Cerco ocular: gris sin plumas.

Hembra (diferencias con respecto al macho).

Cabeza más pequeña y mas redonda, arriba del pico mas fino. El plumaje del pecho y del vientre puede ser mas claro en las hembras

Observaciones

Una coloración roja en el plumaje de la cabeza será penalizada. Sujetos que tienen diseño dorsal con bordes amarillo-verde son mezcla con Rosella cabeza pálida.

Platycercus flaveolus

Taille 33 cm



Cotorra pajiza

Talla, postura y condición

Talla: 33cm, estructura pequeña y poderosa.

Postura: entre 55-60°, elegante, derecha y fiero. Alas plegadas.

Condición: el pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes

Color y dibujo:

Macho

Zona de plumaje, color

Cabeza, nuca y toda la parte inferior: amarillo pálido.

Coberteras caudales inferiores y banda frontal: rojas.

Mancha de la mejilla: azul.

Dorso y coberteras centrales de las alas: negras con un borde amarillo pálido.

Cobertera de las alas: azules.

Mancha sobre la espalda: negra.

Remiges primarias: azul fuerte a azul.

Plumas caudales centrales: verde fuerte con puntos azul fuerte.

Debajo de la cola: azul fuerte.

Pico: color corneo.

Ojos: brunos oscuro.

Patas: grises.

Uñas: color antracita.

Hembra (diferencias con respecto al macho).

En general mas pequeña, parte superior del pico mas fino. Colores y dibujos como el macho.

Obsevaciones

Una coloración roja en el cuello o en el pecho será penalizada.

Platycercus icterotis

Taille 28 cm



Cotorra de Stanley

Talla, postura y condición

Talla: 28 cm, estructura pequeña y derecha.

Postura: alrededor de 60°, formando una línea derecha de la cabeza a la cola, cuerpo bien proporcionado y armonioso, la cabeza presenta una curvadura aplastada.

Condición: el pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes

Color y dibujo:

Macho

Zona de plumaje, color

Frente, arriba de la cabeza, parte superior alrededor de esta, garganta, pecho, vientre, bajo del vientre: rojo fuerte.

Nuca: negra bordeada de verde y de rojo.

Alto del dorso: negro bordeado de rojo.

Dorso, bajo del dorso: negro bordeado de verde.

Obispillo: verde oliva.

Arriba de la cola: verde fuerte con bordes azulados.

Mancha sobre la espalda: negra.

Mancha (oval) sobre la mejilla: amarillo vivo.

Coberteras inferiores caudales: rojas.

Debajo de la cola: azul claro pasando al blanco gris.

Coberteras exteriores de las alas: violeta azul.

Remiges secundarias: verdes pasando al azul.

Remiges primarias: negro gris.

Borde exterior de las remiges primarias: violeta, azul.

Pico: gris-bruno

Uñas: color antracita.

Ojos: brunos fuertes.

Cerco ocular: gris.

Hembra (diferencias con el macho).

Cabeza mas pequeña y mas aplastada, arriba del pico mas fino en la base.

Obsevaciones

Existen dos razas geográficas (Platycercus icterotis y P. Xanthogenys). Esta segunda presenta un negro con dibujo rojo sobre el dorso. Las dos razas unidas no constituyen un mismo equipo.

Platycercus icterotis xanthogenys (Salvadori)

Taille: 26 cm



Cotorra de Stanley de dorso rojo

Diferencia de la raza nominal por la placa en las mejillas amarillas muy pálido, las plumas del dorso y de las alas bordeadas de color huevo y gamuza grisáceo en los machos, gamuza en las hembras, el obispillo oliva grisáceo y las rectrices centrales azules con un reflejo velado, verde.

MACHO

Cabeza y partes inferiores:

Rojas.

Marca de las mejillas:

Amarillo muy pálido.

Plumas del dorso y de las alas:

Negras bordeadas de rojo y de color gamuza grisáceo.

Obispillo: Oliva grisáceo.

Mediana sobre las alas: Negras.

Bajo las alas y borde externo de las remiges primarias: Azules.

Cola: Rectrices centrales: azules, finamente bañada de verde. Laterales azul pálida con el punto blanco.

Pico: Gris.

Iris: Bruno fuerte.

Patas: Gris brunáceo.

Generalmente no tiene banda bajo el ala.

HEMBRAS

Cabeza y alto del pecho.

Verde finamente marcadas de amarillo y de rojo.

Plumas del dorso y de las alas:

Bordeadas de rojo y de gamuza.

Banda frontal: Roja

Bajo, parte inferiores: Rojo tierno con fuerte sufusión de verde.

Placa de las mejillas: Amarillo pálido.

Bandas sub. Alares presentes.