

Guacamayo de illiger

Primolius maracana

Clasificación: Psittaciformes, Psittacidae, Primolius

Zona geográfica: América Central

Tamaño: De 39 a 43 cm

El Guacamayo de illiger o Guacamayo Maracaná (*Primolius maracana*) es una de las 3 especies pertenecientes al género Primolius, incluidas dentro de la familia Psittacidae, orden Psittaciformes. Este guacamayo antes pertenecía al género Ara, de aquí la multitud de nombre que tiene:

1. Ara de illiger
2. maracaná cara afeitada
3. maracaná lomo rojo
4. guacamayo de illiger
5. guacamayo maracana

Esta bonita especie se reproduce fácilmente, sin embargo el hecho de ser una de las especies más ruidosas entre los guacamayos enanos hace que algunos avicultores desistan de tenerlas en sus colecciones.

En ocasiones podemos encontrar algunos ejemplares de Ara de Illiger de importación. Todos estos ejemplares provienen

de Bolivia y Paraguay, dado que en Brasil está totalmente prohibido el tráfico comercial de estas aves. Son aves fáciles de amansar y que tienen cierta habilidad para aprender algunas palabras. Son extremadamente curiosos e inteligentes aunque pueden hacer daño a causa de su tendencia a morder. Aparte de esta conducta, son dulces y amigables. Son muy activos y convive muy bien con otros pájaros.

En general como animales de compañía suelen ser muy afectuosos y bastante habladores.



Descripción

El Guacamayo de illiger es un guacamayo de pequeño tamaño alrededor de 44 cm de longitud. El macho es mayoritariamente de color verde con la frente roja. La coronilla es azul y el resto de la

cabeza de color verde azulado. También presenta algunas plumas rojas en la parte central del abdomen en forma de V y en la parte superior de la rabadilla. La extensa zona facial de piel desnuda es de color blanco y se extiende desde el ojo hasta el pico. Las remeras tienen un matiz azulado, el pico es negro y el iris pardo anaranjado. La hembra presenta menos rojo en la frente pero en cambio la zona del abdomen en forma de V es más fuerte. Los ejemplares jóvenes tienen el pico de color claro que poco a poco se va oscureciendo. Primero la parte inferior y luego la parte superior. Cuando abandonan el nido solo tienen la punta del pico superior de color claro. Las manchas rojas de la frente y el abdomen son débiles. La piel facial es amarillenta y no blanca como la de los ejemplares adultos.

Hábitat Natural

Distribución geográfica y hábitat

El Guacamayo de illiger o ara maracana (*Primolius maracana*) se encuentra en el este de Brasil, desde los estados de Para y Maranhao al Matto Grosso y Rio Grande do Sul, Paraguay y noreste de Argentina.

Este guacamayo vive en las selvas de la costa por encima de los 1000 metros de altitud y en los bosques cercanos a los cursos de agua. Extensas zonas de su área de distribución están siendo explotadas por la agricultura y la industria maderera de manera que los guacamayos se han visto obligados a abandonar gran parte de su espacio vital natural; en algunas zonas ha llegado incluso a desaparecer por completo. Se han desplazado de la franja costanera atlántica, densamente poblada, hacia el interior de la región.

Alimentación

No existe información acerca de la dieta en estado silvestre. A causa de la destrucción de su hábitat natural por deforestación, estos pequeños guacamayos a menudo visitan los campos de cultivo de maíz para alimentarse.

Costumbres

El guacamayo de illiger puede observarse en parejas o en grupos fuera de la época de reproducción. Su vuelo difiere del resto de los guacamayos pequeños por sus movimientos bruscos como latigazos. Su voz es ronca.

Reproducción

Tampoco existe información sobre sus costumbres de anidación y reproducción, sin embargo según algunos autores la época de reproducción en la zona sur empezaría a finales del mes de Octubre. En el norte el comienzo de la estación reproductora tendría lugar algunas semanas más tarde, en Noviembre.

Estatus

Incluido en el apartado I del C.I.T.E.S. desde 1989. La zona más meridional de su área de distribución, en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y Sao Paulo se caracteriza por sus inmensos bosques, parte de los cuales han sido ya sacrificados al progreso en pro de la agricultura. Esta zona está pues densamente poblada y muy industrializada de manera que es fácil pensar que en un futuro muy cercano estos guacamayos desaparezcan completamente de esta región. En las proximidades de las cataratas del río Iguazu el ara de Illiger es todavía muy común. Toda la



región que rodea las cataratas donde se encuentran las fronteras de Brazil, Argentina y Paraguay ha sido declarada reserva natural de manera que el espacio vital utilizado por estas aves se mantendrá intacto en su estado original.

Alimentación

La dieta del guacamayo de illiger ha de ser muy variada y ha de incluir un 25% de legumbres hervidas y semillas germinadas, un 25% de mezcla de semillas secas, 30% de verduras y un 20% de fruta.

Estos guacamayos suelen comer cogiendo los trozos de comida con la unas y son muy remilgados como los gatos de manera que de ningún modo cogerán los trozos que hayan caído al suelo, rechazando la comida que ya este mordisqueada.

Reproducción

La estación reproductora del ara maracana se inicia generalmente en los meses de Marzo o Abril, sin embargo algunas parejas lo hacen en Enero o incluso en los meses de Agosto y Octubre.

La caja de anidación de este guacamayo debe tener un diámetro interior de 25 cm y una profundidad de 52 cm con un orificio de entrada de 8,5 cm de diámetro.

La puesta suele ser de tres huevos aunque puede llegar a poner hasta cinco. El intervalo de puesta suele ser de hasta tres días entre un huevo y el siguiente. El período de incubación es de 26 o 27 días y se inicia después de la puesta del primer huevo. El macho no participa en la incubación pero siempre permanecen en la percha a la entrada del nido haciendo guardia. Los pichones permanecen en el nido por espacio de noventa días en los climas más fríos y de 60 a 70 en los más cálidos. Una vez abandonan el nido son alimentados por sus padres durante tres meses.

Los voladores donde están alojados deben separarse de los voladores adyacentes con doble tela metálica ya que los guacamayos de Illiger son muy agresivos con los ocupantes vecinos. Los pichones permanecen dentro del nido por espacio de noventa días en las zonas climáticas más frías. En zonas más cálidas los jóvenes abandonan el nido mucho antes alrededor de los 60 o 70 días. Una vez abandonan el nido son alimentados por sus padres durante tres meses. Los voladeros donde están alojados deben separarse de los voladeros adyacentes con doble tela metálica ya que los guacamayos de Illiger se muestran muy agresivos con los ocupantes vecinos durante la época reproductiva.

<http://www.mundoexotics.com/>