

Loro Choroy

Enicognathus leptorhynchus

Clasificación: Psittaciformes, Psittacidae, Enicognathus

Zona geográfica: Chile

Tamaño: De 39 a 43 cm

El Loro Choroy (*Enicognathus leptorhynchus*) es una de las 2 especies pertenecientes al género *Enicognathus*, incluidas dentro de la familia *Psittacidae*, orden *Psittaciformes*.

El Loro Choroy mide 40 centímetros de largo de los que 17 pertenecen a la cola, suelen pesar de 200 a 250 gramos. Su plumaje es de color verde oscuro. En la cabeza posee una corona con ribetes transversales negros, destacando una mancha rojiza entre la frente y la zona delantera de los ojos que son pequeños con el iris color naranja, posee anillo ocular gris. La cola es roja oscura con la punta verdosa, el abdomen también presenta una mancha rojiza. El pico es gris oscuro, estrecho y ligeramente curvado, con mandíbula superior larga y ganchuda (es el doble que la mandíbula inferior), que es el detalle físico más característico y destacable de la especie. Las patas son color carne.



No hay dimorfismo sexual entre macho y hembra, por eso es muy difícil distinguirlos, para conocer exactamente su sexo debemos realizar una prueba de ADN en algún laboratorio especializado. Los jóvenes cuando abandonan el nido son bastante parecidos a sus progenitores, aunque suelen ser de un verde más oscuro, tienen la mandíbula superior del pico más corta y el anillo ocular es blanco destacando sobre el de los padres que es grisáceo.

Este loro es muy gregario y se mantiene en bandadas aún en la época reproductiva, tienen preferencia para pasar la noche en grupos numerosos y bulliciosos en árboles concretos, lo que facilita mucho su captura por los furtivos.

Hábitat Natural

Distribución geográfica y hábitat

El Loro Choroy es un ave endémica de Chile y vive exclusivamente en ese país. Habita los bosques húmedos siempre verdes de la zona sur ubicados desde el nivel del mar hasta los 1.400 metros de altura, desde Aconcagua hasta Chile y en alguna ocasión se le puede ver en la región de Aisén. Frecuenta los claros de los bosques, visita huertos frutales y campos agrícolas de cereales, por lo que no es popular entre los agricultores que lo consideran una plaga y los envenenan sistemáticamente para que no causen daños en las cosechas.

Costumbres y reproducción

El loro Choroy es muy sociable y bullicioso y vive todo el año en bandadas de 50 a 200 ejemplares, en ocasiones han llegado a reunirse mas de un millar de aves. En primavera las bandadas son pequeñas pero en invierno son muy numerosas. Se le ve entre las ramas de los árboles o en el suelo alimentándose de semillas y plantas o bien arrancando raíces y tubérculos con la mandíbula superior de su pico que utilizan hábilmente como herramienta. Al llegar el invierno efectúan migraciones estacionales, abandonan las montañas para desplazara a los valles más bajos; las bandadas vuelan en formaciones de 3 o 4 líneas (parecido a las gaviotas); el graznido es constante durante el vuelo, manteniendo entre ellos un permanente contacto sonoro. Es característico de esta especie el que, mientras la bandada está en el suelo, algunos ejemplares ejercen de centinelas colocándose estratégicamente en las ramas altas de los árboles cercanos, vigilando por si se acerca algún depredador. En caso de peligro emite un estridente grito y toda la bandada vuela en busca de la seguridad de las ramas más altas. Por eso los habitantes de las zonas rurales del sur de Chile dicen: “si ves un pájaro verde en la rama mas alta de un árbol vigilando todo lo que ocurre, es un “Choroy” y el resto de la bandada esta alimentándose en el suelo”. En su medio natural anida en oquedades en los árboles a la mayor distancia posible del suelo, aunque, debido a la escasez de lugares adecuados en los bosques, puede nidificar en pequeñas colonias en los acantilados de piedra caliza, barrancos y en ocasiones en termiteros.

Estatus

Aunque de momento se encuentra incluido en CITES II, sus poblaciones han sufrido los últimos años una drástica disminución de ejemplares debido especialmente a la perdida de hábitat (por incendios y deforestación para la obtención de madera, creación de campos de cultivo), envenenamientos y matanzas por parte de los agricultores y caza furtiva para la obtención de ejemplares para mascotas. Han desaparecido del centro del país, quedando reducidas sus poblaciones a la zona sur. Por todo esto el gobierno Chileno ha tenido que tomar unas drásticas medidas para lograr su conservación y supervivencia.

Alimentación

Los Loros Choroy se alimentan de semillas, frutas, bayas, nueces, brotes de hojas y diversas raíces y tubérculos. El choroy es muy aficionado a los piñones y en los meses de marzo y abril, cuando los piñones maduran, se juntaban en los bosques de araucaria, que



ahora ya están prácticamente desaparecidos en Chile. En otras épocas del año se alimentan de las semillas de varias especies de *Nothofagus*, especie dominante en las selvas donde habitan y también visitan las zonas de cultivo.

En cautividad debemos alimentar al Loro Choroy con una mezcla de semillas consistente en: varias clases de mijos (rojo, blanco, amarillo), alpiste, avena, cañamón, semillas de girasol, semillas de maravilla, trigo, avena, cebada, maíz partido y semilla de alazor. Frutas, verduras y hortalizas de todo tipo, hierbas silvestres, semillas germinadas, maíz semimaduro, les encanta las mazorcas tiernas, de las que extraerán con deleite los granos y les servirá de entretenimiento. Si lo aceptan es interesante que consuman pienso extrusionado, pero no como alimentación exclusiva. Tienen tendencia a la obesidad por lo que habrá que procurar que hagan mucho ejercicio y que no consuman demasiadas semillas oleaginosas (girasol, negrilla, cáñamo etc.). Las semillas de girasol germinadas y secas son utilizadas con muy buenos resultados por criadores alemanes especialmente en época de cría.

Por sus hábitos terrestres y su costumbre de escarbar en el suelo son propensos a padecer gusanos intestinales, por eso deben desparasitarse con regularidad, especialmente si están en un aviario con el suelo de tierra. Es imprescindible que tengan siempre a su disposición un bloque de cal y sales minerales para prevenir deficiencias de calcio y permitir que desgasten de forma natural la parte superior del pico que crece continuamente. También debemos proporcionarle ramas verdes de árboles frutales (preferiblemente con yemas y nudos verdes que se comerán con deleite), procurando lavarlos antes por si están tratados con insecticidas. Esto les servirá de distracción y evitaremos problemas de picaje.

Reproducción

No es difícil conseguir la cría del Loro Choroy en cautividad, pero en Europa muy pocos aficionados lo han intentado, quizás porque ser un auténtico desconocido al que no se le ha dado ningún valor ornitológico. De hecho son pocas las aves que pueden encontrarse fuera de Chile, tan sólo algunos ejemplares en Europa o EUA en parques zoológicos y colecciones particulares.

El primer caso de cría en Europa data de 1.913 en Holanda, pero fué en los años 70 cuando empezaron a llegar ejemplares, aunque no en gran cantidad pues no tuvo demasiado éxito entre los aficionados. Tampoco en Chile se está intentando la cría en cautividad, quizás porque como los hay salvajes y son fáciles de conseguir, no se le da importancia a la especie y son muchos los que desconocen que está en grave peligro de extinción. Cuando está aclimatado es muy activo, juguetón, robusto y resistente, aunque debe contar con un refugio que los proteja de las inclemencias del tiempo, si se alojan en un aviario exterior. Le encanta bañarse por eso le proporcionaremos un recipiente adecuado a su tamaño y cambiaremos el agua diariamente. El baño nunca le puede faltar a un "choroy", es una de sus mayores satisfacciones. Otras características de esta ave son su forma de beber (para tragar el agua inclinan totalmente la cabeza hacia atrás como las palomas) y su fama de "comilón", les encanta comer y son poco exigentes. Cuando ven aparecer a sus dueños con la comida arman un gran escándalo de satisfacción.

Las parejas deben alojarse en un aviario de dimensiones mínimas de 2 m. de alto, por 1,5 de ancho y 3 m. de largo.

En la zona mas alta del aviario y en la zona cubierta colocaremos un nido de madera de 25 x 50 x 30 cm. con un orificio de entrada de 8 cm. El cortejo empieza en marzo-abril y la hembra deposita de 4 a 6 huevos (en ocasiones 8). La incubación dura 26 días y comienza después de la puesta del primer huevo, de manera que las crías nacen de forma sucesiva. Al principio el macho alimenta sólo a la hembra y ésta a las crías, que permanecen en el nido de 7 a 8 semanas. En libertad las crías son alimentadas en orden decreciente: el mayor es alimentado en primer lugar y así sucesivamente hasta llegar a los menores, que solamente logran sobrevivir en años de abundancia. Evidentemente en

cautividad, al tener siempre alimento disponible, sacan adelante toda la nidada sin problemas, pues son excelentes padres. Cuando abandonan el nido los jóvenes suelen ser bastante tranquilos, curiosos y atrevidos. Algunos criadores los definen como “payasos”; cualquier objeto les sirve para jugar y revolcarse en el suelo con él, es fascinante ver lo que puede hacer un ejemplar joven de Choroy con una pelota. En cambio otros criadores comentan que no les gusta demasiado que los cojan aunque hayan sido criados a mano.

<http://www.mundoexotics.com/>